

suicidio identificando estos periodos. La prevención del suicidio en pacientes que sufren un desorden afectivo depende primariamente del reconocimiento y tratamiento de la enfermedad depresiva.

F. DEL VILLAR

Ingrahan, M. y M. Moriarity, "Understanding of the Ganser Syndrome". *Compr. Psychiat.* 8: 35-44 pp., 1967.

El síndrome de Ganser con frecuencia llamado síndrome de las respuestas aproximadas, está caracterizado por alucinaciones auditivas y visuales, conciencia borrosa, desorientación en tiempo y espacio, analgesia, hiperestesia, amnesia y

pérdida de la capacidad de introspección.

El síndrome puede presentarse en varias enfermedades mentales. Es inducido por situaciones de *stress* y se explica por la regresión de las funciones del ego: con alteraciones de la percepción, de la síntesis y de la atención y una identificación errónea de objetos, los cuales son considerados como similares por asociación pero diferentes de los objetos actuales.

Los pacientes que exhiben el síndrome de Ganser, sufren una regresión importante y tienen serios desórdenes del pensamiento. Esto es importante desde el punto de vista médico-legal y desde el punto de vista del cuidado y tratamiento de los enfermos.

F. DEL VILLAR

SUSCRÍBASE A NUESTRA REVISTA, *enviando cheque a:*

REVISTA DE PSICOANÁLISIS, PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA,

Fondo de Cultura Económica.

Av. de la Universidad, 975,

México 12, D. F.

(Teléfono 24-22-04)

Valor anual: { en México \$ 50.00
en el extranjero Dls. 5.00

Cortesía de SR. MAURICIO WEISSMANN

